

核准日期: 2009年04月02日 修改日期: 2021年06月11日
修改日期: 2009年07月03日 修改日期: 2025年10月01日
修改日期: 2021年09月10日

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语: 本品为人血液制品, 尽管经过筛选及病毒灭活处理, 仍不能完全排除含有病毒等未知病原体而引起的血源性疾病传播的可能, 使用本品时, 应查验和记录所用产品的生产企业和批号。

【药品名称】通用名称: 人血白蛋白 英文名称: Human Albumin 汉语拼音: Renxue Baidanbai

【成份】

1. 人血白蛋白, 来源于健康人血浆。
2. 主要辅料: 辛酸钠
3. 分子量: 66300
4. 钠不超过160mmol/L, 钾不超过5.2mmol/L, 半渗透压140-170mmol/L(25℃)

【适应症】

1. 失血、创伤及烧伤等引起的低血容量休克。
2. 由于肾病综合征因蛋白丢失引起的水肿病人和肝硬化引起的水肿, 输注人血白蛋白可能有助于治疗。

3. 低蛋白血症的患者, 在治疗原发性疾病的同时, 输注白蛋白是一种有益的辅助治疗。

4. 用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。

【规格】5% (5g/瓶), 每瓶含人血白蛋白5g, 装量100ml。

【用法用量】

本品为处方药, 应在医师指导下使用。

核准日期：2009年04月02日 修改日期：2021年11月22日
修改日期：2016年01月26日 修改日期：2025年03月31日
修改日期：2020年12月30日 修改日期：2025年03月31日

TONROL 同路®



核准日期：2006年09月28日 修改日期：2021年04月01日 修改日期：2025年10月01日
修改日期：2014年09月26日 修改日期：2021年09月10日
修改日期：2020年08月11日 修改日期：2021年11月22日

TONROL 同路®

用法

用量

规格

【用法用量】

【规格】

【执行标准】《中国药典》2020年版三部附录B 通则 YBS10382020

【批准文号】国药准字S10960084

【药品上市许可持有人】

名称：同路生物制药有限公司 地址：合肥

同路生物

同路生物

核准日期：2006年09月29日 修改日期：2021年09月10日 修改日期：2025年10月01日

修改日期：2014年09月26日

修改日期：2021年09月10日

修改日期：2020年08月11日

修改日期：2021年11月22日

修改日期：2020年12月30日

修改日期：2025年03月31日

TONROL 同路®

人血白蛋白说明书

20% (50ml:10g)



请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品为人血制品，尽管经过筛检及病毒灭活处理，仍不能完全排除含有病毒等未知病原体而引起的血源性疾病传播的可能。使用时，应查验和记录所用产品的生产企业和批号。

【药品名称】通用名称：人血白蛋白 英文名称：Human Albumin 汉语拼音：Renxue Baidanbai

【成份】

- 1.人血白蛋白，来源于健康人血浆。
- 2.主要辅料：辛酸钠
- 3.分子量：66300
- 4.钠不超过160mmol/L，钾不超过5mmol/L，氯不超过10mmol/L。

核准日期：2009年04月02日 修改日期：2021年11月22日
2020年12月30日 修改日期：2025年10月01日
21年09月10日

核准日期：2016年
修改日期：20
修改日期：20

人血白蛋白说明书

25% (12.5g / 瓶)

人血白蛋白

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本品为人血制品，虽经特殊处理及病毒灭活处理，仍不能完全排除含有病毒等未知病原体而引起血源性感染传播的可能，使用本品前应进行病毒筛查。

【名称】通用名称：人血白蛋白，英文名称：Human Albumin，汉语拼音：Renxue Baiqibai。

人血白蛋白，来源于健康人血浆。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。